

Поступила в редколлегию 20.10.82.

УДК 517.5

В. Э. КАЦНЕЛЬСОН

К ТЕОРИИ ЦЕЛЫХ ФУНКЦИЙ КЛАССА КАРТРАЙТ

Для целой функции  $F(z)$  экспоненциального типа  $\sigma_F \stackrel{\text{def}}{=} \overline{\lim} |z|^{-1} \ln |F(z)|, (|z| \rightarrow \infty), 0 \leq \sigma_F < \infty$  индикатор роста  $h_F(\theta)$  определяется как  $h_F(\theta) = \lim r^{-1} \cdot \ln |F(re^{i\theta})|, (r \rightarrow \infty)$ . Целая функция  $F(z)$  называется функцией класса М. Картрайт, если  $F$  экспоненциального типа, и

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\ln^+ |F(x)|}{1+x^2} dx < \infty.$$

Определение. Область, получающаяся удалением из полуплоскости  $\text{Im } \theta > 0$  система отрезков (разрезов)  $\text{Re } \theta = k\pi, 0 \leq \text{Im } \theta \leq h_k, (k \in \mathbb{Z})$ , где  $0 \leq h_k < \infty$ , называется гребенчатой областью (рис. 1).

В это определение включаются и предель-




Рис. 1




Рис. 2

ные случаи «четверть плоскости с разрезами» и «полуполосы с разрезами» (рис. 2).

Бесконечно удаленная точка « $\theta = \infty$ » является граничной точкой гребенчатой области.

Пусть  $\theta(z)$  — функция, осуществляющая конформное отображение полуплоскости  $\text{Im } z > 0$  на некоторую гребенчатую область\*, причем  $\theta(\infty) = \infty$ .

Функция  $\theta(z)$  аналитична в  $\text{Im } z > 0$  и непрерывна в  $\text{Im } z \geq 0$ . Функция  $C(z) = \cos \theta(z)$  аналитична в  $\text{Im } z > 0$ , непрерывна

\* Такие отображения составляют узкий подкласс класса отображений, которые применялись в [1] при исследовании экстремальных задач теории целых функций.

в  $\text{Im } z \geq 0$  и вещественна на вещественной оси. По принципу симметрии,  $C(z)$  продолжается до целой функции, которую мы также обозначим через  $C(z)$ .

**Определение.** Функция вида  $C(z) = \cos \theta(z)$ , где  $\theta(z)$  — функция, конформно отображающая  $\text{Im } z > 0$  на некоторую гребенчатую область, и  $\theta(\infty) = \infty$ , называется гребенчатой целой функцией.

Очевидно, всякая гребенчатая целая  $C(z)$  вещественна. Так как  $\text{Im } \theta(z)$  — положительная гармоническая в  $\text{Im } z > 0$ , то

$$\int_{-\infty}^{\infty} \text{Im } \theta(x) \cdot (1+x^2)^{-1} dx < \infty \text{ и } \text{Im } \theta(z) = O((1+|z|^2)/y). \text{ Поэтому}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\ln^+ |C(x)|) \cdot (1+x^2)^{-1} dx < \infty \text{ и } \ln^+ |C(z)| = O((1+|z|^2)/|y|),$$

откуда следует, что всякая гребенчатая целая функция  $C(z)$  является целой функцией класса Картрайт\*.

Так как при  $a = +1$  и при  $a = -1$  все  $a$ -точки\*\* функции  $\cos \theta$  вещественны, то для любой гребенчатой целой функции все ее  $\pm 1$  — точки вещественны. Это свойство характеризует гребенчатые целые функции, как показывает

**Теорема** (В. А. Марченко, И. В. Островский [2, § 1]). *Всякая вещественная целая функция ( $\neq \text{const}$ ), имеющая лишь вещественные  $a$ -точки при  $a = 1$  и при  $a = -1$ , является гребенчатой.*

Подчеркнем, что априорных ограничений на рост функции здесь не налагается, в частности, принадлежность функции классу Картрайт не предполагается, а следует из условий теоремы.

Вещественные целые функции с вещественными  $\pm 1$ -точками возникают, в частности, как дискриминанты Хилла линейных уравнений, описывающих пространственно-одномерные периодические структуры, и в таком качестве фигурировали еще у А. М. Ляпунова. Этот класс целых функций был выделен М. Г. Крейном [3] в связи со спектральными вопросами уравнения струны. В [3] указаны также связи с иными вопросами анализа (функциональными уравнениями Пелля, работами Абеля о периодических цепных дробях).

**Теорема 1.** *Всякая вещественная целая функция  $f(z)$  класса Картрайт представима (неоднозначно) в виде  $f(z) = C_1(z) + C_2(z)$ , где  $C_1, C_2$  — некоторые гребенчатые целые функции, причем  $\sigma_{C_1} = \sigma_{C_2} = \sigma_f$ .*

**Теорема 2.** *Всякая вещественная целая функция  $f(z)$  класса Картрайт представима (неоднозначно) в виде  $f(z) = C_1(z) + C_2(z)$ , где  $C_1, C_2$  — вещественные целые функции ( $\neq \text{const}$ ) та-*

\* При этом  $C(z)$  полином точно тогда, когда гребенчатая область — это «полуполоса с разрезами».

\*\* Напомним, что  $a$ -точками мероморфной функции  $m(z)$  называются корни уравнения  $m(z) - a = 0$ .

кие, что у каждой из них все  $\pm 1$ -точки вещественны, и  $\sigma_{c_1} = \sigma_{c_2} = \sigma_f$ .

Таким образом, теорема 1 является следствием теоремы 2 и цитированной выше теоремы В. А. Марченко — И. В. Островского.

Уместно сопоставить наши теоремы 1, 2 с теоремой 3 из [4].

Далее будем систематически пользоваться терминами, понятиями и результатами глав 7 и 9 монографии Б. Я. Левина [5], где изложены его результаты из [6]. Отметим, что изложение в [6] более подробное, чем в [5], и что эта монография не покрывает полностью работы [6].

**Лемма.** Пусть  $F(z)$  — целая функция класса Картрайт.

Тогда существует целая функция  $\omega(z)$  ( $\neq \text{const}$ ), являющаяся  $P$ -майорантой для каждой из функций  $F(z) + 1$ ,  $F(z) - 1$ ,  $-F(z) + 1$ ,  $-F(z) - 1$ , причем  $\sigma_\omega = \sigma_F$ , а функции  $\omega(z) \pm F(z) \pm 1$  не тождественно постоянны, и не имеют вещественных корней.

Доказательство. Рассмотрим  $r(z) = 4F(z) \cdot \bar{F}(z) + 8(1 + z^2)$ . Функция  $r(z)$  принадлежит классу Картрайт, положительна на вещественной оси, и  $\sigma_r \leq 2\sigma_F$ . По факторизационной теореме Н. И. Ахиезера (см. [5, Приложение 5])  $r(z)$  представима в виде  $r(z) = \Omega(z) \cdot \bar{\Omega}(z)$ , где функция  $\Omega$  не имеет корней в

$\text{Im } z \leq 0$ , и  $h_\Omega(\theta) = \frac{1}{2} h_r(\theta)$ . В частности,  $h_\Omega(\pi/2) = h_\Omega(-\frac{\pi}{2})$  и

$\sigma_\Omega = \frac{1}{2} \sigma_r$ . При любом  $k \geq 0$  функция  $\omega(z) = \Omega(z) \cdot e^{ikz}$  и подавно

будет функцией класса  $P$ . Выберем  $k$  так, чтобы  $\sigma_\omega = \sigma_F$ . По лемме 1, § 4 гл. 7 из [5] функция  $\omega$ , как функция класса  $P$ , будет и функцией класса  $HV$ ; (см. также следствие 3 леммы 2 из [6]). Так как  $|\omega(x)|^2 = 4|F(x)|^2 + 8(1 + x^2)$ , то  $|\omega(x)| > |\pm F(x) \pm 1|$ , ( $-\infty < x < \infty$ ), Отсюда и из леммы 1, § 4 главы 9 из [5] (см. также лемму 2 из [6]) вытекает, что  $\omega(z)$  является  $P$ -майорантой для каждой из четырех целых функций  $\pm F(z) \pm 1$ . Так как  $|\omega(x)| \geq 1 + |x|$ ,  $|\omega(x) \pm F(x) \pm 1| \geq 1 + |x|$ , то функции  $\omega(z)$ ,  $\omega(z) \pm F(z) \pm 1$  не тождественно постоянны, и не имеют вещественных корней.

Доказательство теоремы 2. Пусть  $\omega(z) = p(z) + iq(z)$ , ( $p, q$  — вещественны) — какая-нибудь функция класса  $P$  с  $\sigma_\omega = \sigma_f$ , являющаяся  $P$ -майорантой для каждой из четырех целых функций  $\frac{1}{2}f(z) + 1$ ,  $\frac{1}{2}f(z) - 1$ ,  $-\frac{1}{2}f(z) + 1$ ,  $-\frac{1}{2}f(z) - 1$ , причем  $\omega(z)$ ,  $\omega(z) \pm \frac{1}{2}f(z) \pm 1$  не тождественно постоянны и не имеют вещественных корней. (Существование такой майоранты утверждается в лемме). Согласно § 1, гл. 9 из [5] (см. также [6, лемма 3]), каждая из функций  $\omega(z) \pm \frac{1}{2}f(z) \pm 1$  является функцией класса  $P$ . Дополняя рассуждения из [5], можно получить, что  $\sigma_\omega = \sigma_{\omega \pm 1/2f \pm 1}$ . Таким образом, каждая из четырех целых

функций  $p(z) \pm \frac{1}{2} f(z) \pm 1$  является «вещественной частью» непостоянной\* функции класса  $P$ . Согласно теореме 7, § 4, гл. 7 из [5] (см. также [6, теорему 1]), каждая из функций  $P(z) \pm \frac{1}{2} f(z) \pm 1$  имеет лишь вещественные простые корни, иными словами, целые функции  $\frac{1}{2} f(z) + p(z)$ ,  $\frac{1}{2} f(z) - p(z)$  имеют лишь простые вещественные  $\pm 1$ -точки. Так как «вещественная часть» функции класса  $P$  имеет тот же тип, что и сама функция, то  $\sigma_{p \pm f/2 \pm 1} = \sigma_{\omega \pm f/2 \pm 1} (= \sigma_{\omega} = \sigma_f)$ . Осталось лишь положить  $C_1(z) = \frac{1}{2} f(z) + p(z)$ ,  $C_2(z) = \frac{1}{2} f(z) - p(z)$ .

Теорема 2 интересна с точки зрения теории распределения значений. Для того, чтобы целая функция  $f$  принадлежала классу Картрайт, необходимо, чтобы при каждом  $a$  ее  $a$ -точки  $z_k(a)$  удовлетворяли условию  $\sum |\operatorname{Im} 1/z_k(a)| < \infty$  близости к вещественной оси, и достаточно, чтобы это условие близости выполнялось хотя бы для двух различных  $a$  ( $\neq \infty$ ). (Гораздо более общие утверждения такого рода получены И. В. Островским См. [7, § 2, гл. 6] и ссылки там на более ранние работы И. В. Островского). Наша теорема 2, таким образом, допускает такую трактовку: всякая вещественная целая функция с  $\pm 1$ -точками, близкими к вещественной оси, представима в виде суммы двух вещественных целых функций с  $\pm 1$ -точками, расположенными точно на вещественной оси.

Примерно так же, как теорема 2, может быть доказана

**Теорема 3.** Пусть  $f(z)$  и  $p(z)$  — целые функции класса Картрайт,  $f$  вещественна,  $p$  неотрицательна на вещественной оси, и  $l \geq \max(\sigma_f, \frac{1}{2} \sigma_p)$ .

Тогда  $f$  представима в виде  $f(z) = C_1(z) + C_2(z)$ , где  $C_1$  и  $C_2$  — вещественные функции класса Картрайт,  $\sigma_{C_1} = \sigma_{C_2} = l$ , обладающие тем свойством, что для любой вещественной целой  $e(z)$  такой, что  $\sigma_e \leq l$  и  $e^2(x) \leq p(x)$ , ( $-\infty < x < \infty$ ), все корни уравнений  $C_1(z) + e(z) = 0$ ,  $C_2(z) + e(z) = 0$  вещественны и просты.

Мажоранту  $\omega(z)$  здесь можно строить, факторизуя функцию  $\tilde{r}(z) = f(z) \cdot \bar{f}(z) + 4p(z) + 8(1 + z^2)$ .

Теорема 2 является частным случаем теоремы 3, соответствующим  $p \equiv 1$ ,  $e \equiv +1$ ,  $e \equiv -1$ .

Следствие. Пусть  $f(z)$ ,  $t_1(z)$ , ...,  $t_n(z)$  — вещественные целые функции класса Картрайт, причем  $\sigma_f, \sigma_{t_1}, \dots, \sigma_{t_n} \leq l$ .

\* Нам нужно еще, чтобы функции  $p(z) \pm \frac{1}{2} f(z)$  были непостоянными.

Так как  $\omega(z) \neq \text{const}$ , то этого можно достичь «малым шевелением»:  
 $\omega(z) \rightarrow e^{i\alpha} \omega(z)$ .

Тогда  $f$  представима в виде  $f(z) = C_1(z) + C_2(z)$ , где  $C_1, C_2$  — вещественные целые функции класса Картрайт такие, что для любого  $(\xi_1, \dots, \xi_n) \in R^n$  такого, что  $\sum \xi_j^2 \leq 1$ , все корни уравнений  $C_k(z) + \sum \xi_j t_j(z) = 0$ , ( $k = 1, 2$ ), вещественны и просты.

Нужно лишь применить теорему 3 к  $\rho(z) = \sum t_j(z) \bar{t}_j(z)$ ,  $e \times \times (z) = \sum \xi_j t_j(z)$ .

Подчеркнем, что факторизационная теорема Н. И. Ахиезера является лишь одним из средств построения  $P$ -майорант  $\omega(z)$ . В ряде ситуаций возможны и иные способы построения майорант. Мы делаем это замечание, в частности, потому, что теория классов  $P$ , майорант и связанных с этим вопросом во многом распространяется на целые функции многих переменных (см. [5, главы 7—9]). Однако аналога факторизационной теоремы Н. И. Ахиезера для многих переменных нет (контрпримеры по мотивам 17-й проблемы Гильберта), и приходится выходить из положения иными способами.

Так же, как в одном переменном, доказывается, что если  $f(z_1, \dots, z_n)$  — вещественная целая функция, а  $\omega(z_1, \dots, z_n)$  —  $P$ -майоранта для каждой из функций  $2f(z)$  и  $2$ , то  $f$  представима в виде  $f(z_1, \dots, z_n) = C_1(z_1, \dots, z_n) + C_2(z_1, \dots, z_n)$ , где  $C_1, C_2$  — вещественные целые функции такие, что при  $a = 1$  и  $a = -1$   $a$ -множества каждой из них не пересекаются с трубчатыми областями  $T_+ = \{z: \text{Im } z_j > 0, 1 \leq j \leq n\}$  и  $T_- = -T_+$ , причем каждая из  $C_k$  имеет «тот же рост», что и  $\omega$ . Таким образом, для обобщения теоремы 2 на функции многих переменных нужно уметь строить майоранты для функций многих переменных.

Приведем один из примеров таких построений. Пусть  $\alpha(t) \geq 1$  — монотонно возрастающая функция, удовлетворяющая «условию неквазианалитичности»:

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln \alpha(t)}{1+t^2} dt < \infty.$$

Как показано в [8], существует  $\omega(z)$  нулевого рода с корнями в верхней полуплоскости такая, что  $\alpha(|x|) \leq |\omega(x)|$ , ( $-\infty < x < \infty$ ), причем  $\sup \alpha(|x|) \cdot |\omega(\lambda x)|^{-1} < \infty$  для любого  $\lambda > 0$ . Пусть  $l_1, \dots, l_n \geq 0$ . Положим

$$\omega(z_1, \dots, z_n) = \prod_{1 \leq j \leq n} \{\omega(z_j) \cdot \sin(l_j z_j - i)\}.$$

Функция  $\omega(z_1, \dots, z_n)$  принадлежит классу  $P$  от  $n$  переменных. Пусть  $f(z_1, \dots, z_n)$  — целая функция, допускающая на вещественной оси оценку вида\*  $|f(x_1, \dots, x_n)| \leq \alpha(|x_1|) \dots \alpha(|x_n|)$ ,

\* Эта оценка равносильна оценке вида  $|f(x_1, \dots, x_n)| \leq$

$$\alpha(\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}).$$

а в комплексном пространстве оценку вида  $\ln |f(z)| \leq \sum l_j |z_j| + o(|z|)$ , ( $|z| \rightarrow \infty$ ), следовательно, и оценку  $\ln |f(z)| \leq \sum l_j \times |y_j| + o(|z|)$ , ( $|z| \rightarrow \infty$ ). Тогда так построенная  $\omega(z_1, \dots, z_n)$  будет  $P$ -майорантой для  $f(z_1, \dots, z_n)$ .

Напомним, что рост целой функции  $F(z_1, \dots, z_n)$  экспоненциального типа, удовлетворяющей условию  $\ln^+ |F(x)| = o(|x|)$ , ( $|x| \rightarrow \infty$ ), может быть охарактеризован индикатором Планшереля — Поля (определение см. в [9, гл. 3, § 4]):

$$h_f(y_1, \dots, y_n) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{r \rightarrow \infty} r^{-1} \cdot \ln |F(x_1 + iry_1, \dots, x_n + iry_n)|.$$

(Этот предел один и тот же для всех  $x \in \mathbb{R}^n$ , за исключением множества нулевой  $n$ -мерной лебеговой меры, где возможно «понижение»).

В связи с этим возникает следующий вопрос: Пусть  $f(z_1, \dots, z_n)$  — вещественная целая функция экспоненциального типа, допускающая на вещественной плоскости оценку  $|f(x_1, \dots, x_n)| \leq \varphi(|x|)$ , где  $\varphi \geq 1$  монотонна и удовлетворяет условию неквазианалитичности. Существует ли у этой  $f(z)$   $P$ -майоранта  $\omega(z)$  с тем же, что и у  $f$ , индикатором Планшереля — Поля?

Приведенная выше конструкция дает утвердительный ответ лишь если  $h_f(y) = \sum l_j |y_j|$ .

Теоремы 1; 2 получены автором в 1975 г. и навеяны докладом И. В. Островского на семинаре по теории функций ХГУ, где излагалась теоретико-функциональная часть работы [2].

Список литературы: 1. Ахизер Н. И., Левин Б. Я. Неравенства для производных, аналогичные неравенству С. Н. Бернштейна. — Докл. АН СССР, 1957, 117, с. 735—738. 2. Марченко В. А., Островский И. В. Характеристика спектра оператора Хилла. — Мат. сборник, 1975, 97, № 4, с. 540—606. 3. Крейн М. Г. Об обратных задачах теории фильтров и  $\lambda$ -зон устойчивости. — Докл. АН СССР, 1953, № 5, с. 767—770. 4. Островский И. В. Об одном классе целых функций. — Докл. АН СССР, 1976, 229, № 1, с. 39—42. 5. Левин Б. Я. Распределение корней целых функций. — М.: ГИТТЛ, 1956. — 632 с. 6. Левин Б. Я. Об одном специальном классе целых функций и о связанных с ними экстремальных свойствах целых функций конечной степени. — Изв. АН СССР, 1950, 14, № 1, с. 45—84. 7. Гольдберг А. А., Островский И. В. Распределение значений мероморфных функций. — М.: Физматгиз, 1971. — 430 с. 8. Иноземцев О. И., Марченко В. А. О мажорантах нулевого рода. — Усп. мат. наук, 1956, 11, вып. 2, с. 173—178. 9. Ронкин Л. И. Введение в теорию целых функций многих переменных. — М.: Физматгиз, 1971. — 430.

Поступила в редколлегию 27.12.82.

УДК 513.88

Д. Г. КЕСЕЛЬМАН

О ГРАНИЦЕ ШИЛОВА В СИМПЛЕКСЕ ШОКЕ

В симплексе Шоке  $S$  введем обозначения:  $E(S)$  — множество его крайних точек;  $Sh_S = \overline{E(S)} \setminus E(S)$ ;  $\mu_x$  — максимальная мера, представляющая точку  $x$ ;  $M_x^+(E(S))$  — множество всех вероят-